

Az 1.—2. szám feladataira érkeztek még a következő megoldások:

Bottlik F. 110., *Gaál I.* 103., 104., 110., *Petrényi L.* 105., 110., *Tarnay Katalin* 101., 110., részben jó 109., *Tóth Ilona* 103., 107., 114., *Vladár* 110. két megoldás.

A számok hatványösszegéről szóló feladatok megoldását a következő számban közöljük.

Gyertek, bizonyítsuk be Csebysev tételét! (II. rész.)

Az 5. feladat megoldásával a Legendre-féle

$$n! = 2^{\left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{4}\right] + \left[\frac{n}{8}\right] + \dots} \cdot 3^{\left[\frac{n}{3}\right] + \left[\frac{n}{9}\right] + \left[\frac{n}{27}\right] + \dots} \cdot 5^{\left[\frac{n}{5}\right] + \left[\frac{n}{125}\right] + \dots} \dots$$

azonosságban (ahol a prímszámok persze n -ig mennek) olyan kulcshoz jutottunk, amely alkalmas egyes, a prímszámokra vonatkozó kérdések megoldására. De vajjon hogyan forgassuk ezt a kulcsot, hogy a Csebysev-tétel nyitját megtaláljuk? Mit kezdjünk az $n!$ -sal, hogy épp az n és $2n$ közötti prímszámokról tudósítson bennünket?

CSEBYSEV eredeti bizonyítása egy nagyon bonyolult, az $n!$ segítségével képezett kifejezés vizsgálatán alapul. ERDŐS (és már előtte RAMANUJAN is) a Csebysev-féle kifejezés helyett a sokkal egyszerűbb $\frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{1 \cdot 2 \dots n \cdot (n+1)(n+2) \dots 2n}{1 \cdot 2 \dots n \cdot 1 \cdot 3 \dots n} = \frac{(n+1)(n+2) \dots 2n}{1 \cdot 2 \dots n}$

kifejezést használja. Ezt a kifejezést $\binom{2n}{n}$ -nel (mondd: $2n$ alatt n , vagy $2n$ az n felett)-szokás jelölni: általában $\binom{m}{n}$ -nel az $\frac{m!}{n!(m-n)!}$ kifejezést jelöljük. Ez arról nevezetes, hogy egy m -tagú osztályból ennyiféleképpen lehet kijelölni egy n -tagú küldöttséget; így $\binom{m}{n}$ csak látszólag tört, valójában mindig egész szám az értéke. De ERDŐS sem azért gondolt arra, hogy $\binom{2n}{n}$ segítségével fogjon hozzá a Csebysev-tétel bizonyításához, mert ha egy $2n$ -tagú osztálynak pontosan a felét visszük kirándulni, akkor éppen $\binom{2n}{n}$ -féleképpen lehet kijelölni, hogy kik jussanak a kirándulók közé. Hanem azért, mert $\binom{2n}{n} = \frac{(n+1)(n+2) \dots 2n}{1 \cdot 2 \dots n}$ meg kell, hogy érezze, hogy n és $2n$ között vannak prímszámok. Hiszen ezekkel a prímszámokkal minddel osztható, mert a számlálója osztható velük, de a nevezője nem; az n -ig terjedő prímszámok azonban a nevezőjében

is előfordúlnak, így ezek közül ok kiesik egyszerűsítés közben. Várható hát, hogy ha feltételezzük, hogy n és $2n$ között nincs prímszám, akkor $\binom{2n}{n}$ prímtényezősz felbontásából sokkal kisebb értéket kapunk $\binom{2n}{n}$ számára, mint amekkora valójában. Ismerkedjünk meg hát közelebbről a $\binom{2n}{n}$ -nel!

6. Mutassuk meg, hogy ha a pozitív szám, akkor $[2a] - [a]$ értéke vagy 0, vagy 1.

7. Mutassuk meg, hogy $\binom{2n}{n}$ mindig egész szám.

8. Mutassuk meg, hogy $\binom{2n}{n}$ törzstényezősz felbontásában egyik prímszám hatványa sem lehet nagyobb $2n$ -nél. (A hatványról van szó, nem a hatványkitevőről!)

9. Mutassuk meg, hogy $\binom{2n}{n}$ prímtényezősz felbontásában a $\sqrt{2n}$ -nél nagyobb prímszámok legfeljebb első hatványon szerepelnek (azaz vagy nem szerepelnek, vagy csak első hatványon).

10. Mutassuk meg, hogy $\binom{2n}{n}$ nem osztható a $\frac{2}{3}n$ és n közötti prímszámokkal (n -et beleértve, ha prímszám; $\frac{2}{3}n$ -et akkor sem értve bele, ha n osztható 3-mal és $\frac{2}{3}n$ prímszám).

Kalmár László

Helyreigazítás.

Előző számunk néhány feladatába hiba csúszott. Alább közöljük a helyes szöveget:

140. Határozzuk meg az A, B, C, D számjegyek értékét a következő szorzásban:

$$A B C D \cdot D = C B A D.$$

Bukovszky

145. Egy derékszögű háromszög oldalai számtani haladványt alkotnak. Mutassuk meg, hogy a beírt kör sugara a haladvány különbsége.

Berend Iván

150.-ben t_{ABDA} helyett t_{BCDA} és 151.-ben CC_2 helyett CC_3 olvasandó. Ezen feladatok megoldása pótlólag beküldhető.